

Semaine de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens

Novembre 18-24, 2025

La résistance aux antimicrobiens (RAM) – lorsque les bactéries et autres micro-organismes ne répondent plus au traitement – constitue une menace croissante pour la santé des patients. Le Programme de gestion des antimicrobiens (PGA) du CUSM se consacre à garantir une utilisation sûre et efficace des antibiotiques. Grâce à des conseils cliniques, à la formation, à la surveillance et à la recherche, nous visons à optimiser les traitements des infections et à réduire la résistance aux antibiotiques, afin de préserver leur efficacité pour les générations futures.

⅓ des prescriptions d'antibiotiques au CUSM pourraient être inappropriées ou excessives.

- Les cliniciens sont confrontés quotidiennement à un dilemme : choisir entre prescrire l'antibiotique le plus avancé à un patient ou préserver ces agents afin de protéger l'ensemble de la communauté.
- Notre équipe PGA (composée d'infectiologues et de pharmaciens) effectue **des audits réguliers** et fournit **des commentaires en temps réel** sur les prescriptions d'antibiotiques aux équipes soignantes.
- Des recommandations visant à interrompre l'administration d'antibiotiques ont été formulées dans **38 % des cas examinés**.

Les effets indésirables liés aux antibiotiques sont sous-estimés



- Réactions allergiques
- Toxicité pour le foie, les reins et la moelle osseuse
- Modifications du microbiome intestinal
- Infections à C. difficile
- Colonisation et infection par des bactéries résistantes


Le saviez-vous ?

- Le CUSM utilise un outil de soutien clinique de pointe pour rationaliser les opérations concernant la gestion des médicaments.
- L'équipe a reçu une subvention des **IRSC** pour évaluer les interventions en matière de gestion des médicaments dans les unités de soins intensifs du CUSM. (Restez à l'écoute pour des nouvelles sur le BAST_ICU!)




Antibiotiques les plus couramment prescrits au CUSM

- Ceftriaxone
- Pipéracilline-tazobactam
- Amoxicilline-acide clavulanique
- Vancomycine
- Céfazoline
- Méropénem
- Ciprofloxacine



Les taux de résistance restent faibles et globalement stables grâce aux efforts de prévention, mais ils sont plus élevés dans les unités de soins intensifs



Ressources

Disponible : portail du CUSM et site Web ASP

- 🔗 [Lignes directrices du CUSM sur les antibiotiques pour adultes](#)
- 🔗 [Lignes directrices du CUSM sur les antibiotiques pour enfants](#)
- 🔗 [Guides du CUSM sur les antibiotiques](#)
- 🔗 [MUHC Antibiogrammes du CUSM](#)