

EN PRÉPARATION POUR VOTRE PRÉLÈVEMENT D'OVULES PRÉVU LE _____.



Deux (2) jours avant votre prélèvement, soit le _____.

1. Prendre votre dernière dose de _____ avant _____ h.
2. NE PLUS prendre _____.
3. 36 heures ou 38 heures avant votre prélèvement d'ovules, prendre votre injection de :

Ovidrel

Ovidrel 250 mg

Heure: _____

OU

HCG

- HCG 10,000 IU
 HCG 5,000 IU
 HCG 3,333 IU
 HCG 2,500 IU

Heure: _____

OU

Buserelin

Buserelin 1 mg

Heure: _____



Il est possible que nous ne puissions effectuer le prélèvement d'ovules si vous ne prenez pas cette injection comme indiqué ci-dessus.



Un (1) jour avant votre prélèvement, soit le _____.

- Aucune injection aujourd'hui
- Ne pas manger ni boire après minuit – pas d'eau. Il est important que votre estomac soit complètement vide.



Le jour même du prélèvement, soit le _____.

- Veuillez arriver à la clinique à _____
- **Vous ne pouvez pas conduire** aujourd'hui à cause des médicaments que vous devrez prendre durant la procédure. Quelqu'un **devra** vous accompagner en quittant la clinique.
- Votre partenaire devra fournir son échantillon de spermatozoïdes en arrivant à la clinique (pas plus de 2 ou 3 jours d'abstinence sont recommandés)
- Prenez un bain ou une douche la veille au soir ou le matin du prélèvement. Évitez le parfum, le maquillage et le vernis à ongles.
- Apportez les médicaments suivants :
 Crinone Endometrin Prometrium Progesterone Doxycycline Medrol Estrace
- Apportez votre carte d'assurance maladies et votre carte d'hôpital bleue **ainsi que celle de votre partenaire**
- Apportez une collation à manger après le prélèvement
- Apportez une serviette hygiénique
- Prévoyez le gardiennage si nécessaire, car les enfants ne sont pas permis dans la salle d'opération, ni la salle de réveil, et ne peuvent être laissés sans surveillance dans la salle d'attente