

Couverture RAMQ

Le Régime d'assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre actuellement jusqu'à neuf (9) inséminations intra-utérines, toutefois cela pourrait changer. Si votre traitement n'est pas couvert, référez-vous à notre liste de prix.

Avant votre insémination

Tests sanguins

Vous et votre partenaire (si applicable) devez avoir fait les tests sanguins suivants au cours des 12 derniers mois : Hépatite B Antigène, Hépatite C, Anti-HBc (IgG & IgM), VIH et VDRL

Formulaire de consentement au traitement

Vous et votre partenaire (si applicable) devez avoir signé en présence d'un témoin et retourné le formulaire de consentement au traitement.



Le traitement peut être retardé si les résultats des tests sanguins ou le formulaire de consentement n'ont pas été reçus.



Appelez au 514 843-1650, du lundi au vendredi de 8h à 16h pour prendre vos rendez-vous d'échographie. Précisez que l'échographie se fait dans le cadre d'un traitement d'insémination.

Notez que les échographies se font uniquement durant la semaine.

Si le jour de votre échographie tombe le samedi, demandez un rendez-vous pour le vendredi.

Si le jour de votre échographie tombe le dimanche, demandez un rendez-vous pour le lundi.

Instructions relatives au traitement pour les patientes devant prendre du :

Femara

Prenez _____mg de Femara les **jours 2, 3, 4, 5 et 6** de votre cycle.

Le **jour 1** de votre cycle, prenez un rendez-vous pour passer une **échographie de monitoring** le **jour 10** de votre cycle. Après votre échographie, vous serez informée de toute autre échographie.

OU

FSH ou HMG

Le **jour 1** de vos menstruations (écoulement normal), prenez rendez-vous pour passer une **échographie** le **jour 2, 3, ou 4** de votre cycle.

Si les résultats de l'échographie sont normaux :

Vous devrez prendre : _____IU de _____ les jours_____.

Vous devrez également prendre rendez-vous pour une **deuxième échographie** le **jour 9** de votre cycle afin d'évaluer la croissance des follicules dans les ovaires. Après chaque échographie, vous serez informée de tout changement à vos doses de médicaments et de toute autre échographie.




Le report du traitement :

Pour diverses raisons comme un kyste ovarien, polype ou autre problème, votre traitement peut être reporté, auquel cas vous devrez répéter cette étape le mois prochain.

Injection d'Ovidrel

Lorsque l'échographie indique que le plus grand follicule a atteint un degré de maturité adéquat, vous devrez recevoir une injection d'Ovidrel visant à entraîner la libération de l'ovule(s) en vue de l'insémination.

L'Ovidrel pourrait être administrée en clinique. Veuillez donc apporter votre Ovidrel lors de vos rendez-vous d'échographie afin d'être en mesure de recevoir votre injection au moment propice.

 Si votre échographie révèle la présence de plus de 2 à 3 follicules, il y a un risque de grossesse multiple (plus d'un bébé) et il est possible qu'on vous conseille d'annuler votre cycle de traitement.

Votre rendez-vous pour insémination intra-utérine

Le jour de votre injection d'Ovidrel, vous devrez vous présenter à l'Accueil pour demander un rendez-vous pour votre insémination comme prescrit par votre médecin (l'insémination aura lieu 1 ou 2 jours après l'injection d'Ovidrel). On vous dira l'heure à laquelle votre partenaire devra se présenter à la clinique le jour de l'insémination (si applicable).

Instructions pour la collecte de l'échantillon de sperme

- Pas plus de 2 à 3 jours d'abstinence (pas d'éjaculation) est recommandé avant la date de l'insémination.
- L'échantillon de sperme peut être produit (de préférence) au Centre de la reproduction du CUSM. La clinique dispose de deux salles privées prévues à cette fin.
- L'échantillon de sperme peut être produit à la maison, auquel cas vous devez :
 - Vous procurer un contenant stérile à l'accueil avant le jour de l'insémination;
 - Apporter l'échantillon le jour de l'insémination (seul le partenaire peut apporter l'échantillon);
 - Arriver à la clinique dans les 60 minutes suivant l'éjaculation;
 - Garder l'échantillon de sperme le plus possible à la température du corps.

Progestérone après l'insémination

Si la Progestérone vous a été prescrit, vous devez commencer à prendre la Progestérone _____ jour après votre insémination et continuer jusqu'à 12 semaines de grossesse.

Test de grossesse

Prenez un rendez-vous pour le test de grossesse par prise de sang qui doit être effectuée 16 jours après l'insémination. Si le test est positif, vous devrez prendre rendez-vous pour une échographie de viabilité 2-3 semaines plus tard pour confirmer la grossesse.

**Pour toute question concernant votre traitement, veuillez appeler
la ligne d'information téléphonique des soins infirmiers au 514 843-1650, option 4.**